



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σέρρες, 2 Οκτωβρίου 2017  
Αριθμ. Πρωτ. Φ.25./9226

Ταχ. Δ/νση : Κερασούντος 2  
Τ.Κ. - Πόλη : 621 10 Σέρρες  
Πληροφορίες : Παπασταμόπουλος Ξ.  
Τηλέφωνο : 2321047509  
FAX : 2321047504  
Ηλ/νική Δ/νση : <http://dipeserron.gr>  
e-mail : mail@dipe.ser.sch.gr

ΠΡΟΣ:  
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Σερρών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση κοινής επιστολής Δ/ντή Π.Ε. Σερρών και Προϊσταμένου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σερρών. »

Σας διαβιβάζουμε την κοινή επιστολή του Δ/ντή Π.Ε. Σερρών, Παπασταμόπουλου Ξενοφώντα, και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σερρών, Αναστασιάδη Αναστασίου και παρακαλούμε να διανεμηθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Δ/ντης  
Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών  
Ξενοφών Παπασταμόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σέρρες, 2-10-2017  
Αριθμ. Πρωτ: Φ.25/9216

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κερασούντος 2  
Τ.Κ. - Πόλη : 621 10 Σέρρες  
Πληροφορίες : Παπασταμόπουλος  
Τηλέφωνο : 2321047502  
FAX : 2321047504  
Ηλ/νυκή Δ/νση : <http://dipe.ser.sch.gr>  
e-mail : mail@dipe.ser.sch.gr

ΠΡΟΣ

Γονείς και Κηδεμόνες  
Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας  
Π.Ε. Σερρών

Κοιν. Περιφερειακή Διεύθυνση  
ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίας

Θέμα: Εμβολιασμός μαθητών, -τριών

Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες,

Το τελευταίο διάστημα η χώρα μας βρίσκεται μπροστά στον εφιάλτη της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ιλαράς καθώς τα κρούσματα της ασθένειας αυξάνουν συνεχώς σύμφωνα με σημερινά επικαιροποιημένα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς τριάντα νέα κρούσματα ιλαράς μέσα σε μια βδομάδα εμφανίστηκαν σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο συνολικός τους αριθμός να ανέβει στα 196.

Την ίδια ώρα 350.000 παιδιά, ηλικίας από 15 μηνών έως τεσσάρων ετών, είναι ανεμβολιαστα.

Η μεγάλη πλειονότητα όσων έχουν προσβληθεί από την ασθένεια είναι άτομα ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό, κατά κύριο λόγο της ηλικιακής ομάδας 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολιαστοί ή ατελώς εμβολιασμένοι.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, τονίζει ότι «η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας, η εντατικοποίηση των εμβολιασμών και η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών αποτελούν απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου».

Επισημαίνουμε ότι η ιλαρά ήταν μια ασθένεια που είχε εξαλειφθεί. Σήμερα επανεμφανίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Κατά την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 14.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 41 θάνατοι. Παράλληλα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες ζητάει να εμβολιάζονται τα παιδιά σε μικρότερη ηλικία, στους 12 μήνες αντί για τους 15.

Να επαναλαμβάνεται σύντομα η 2η δόση, έτσι ώστε σε αυτήν την περίοδο που υπάρχει μία επιδημική έξαρση, να ενισχύσουμε ακριβώς την ανοσιακή απάντηση η οποία υπάρχει στον παιδικό πληθυσμό και **συνολικά στον πληθυσμό της χώρας**. Η αιτία της **επιδημίας** είναι ο φόβος για το εμβόλιο, το αντιεμβολιαστικό «κίνημα» που ξέσπασε σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει προκαλέσει έξαρση της νόσου σε πολλές χώρες ακόμα και στη γειτονιά μας. Περίπου 30% των περιπτώσεων ιλαράς εμφανίζουν μια ή περισσότερες επιπλοκές που είναι συχνότερες σε παιδιά κάτω των 5 ετών και σε ενήλικες άνω των 20 ετών.

Οι **συχνότερες επιπλοκές** σε ότι αφορά το πεπτικό είναι η διάρροια (8%) και σπανίως η παροδική ηπατίτιδα.

**Σοβαρότερες επιπλοκές** που μπορούν να προκληθούν είναι:

- η ιογενής πνευμονία ή η δευτεροπαθής από μικρόβια (συχνότητα 6%) η οποία αποτελεί και τη συχνότερη αιτίαθανάτου
- η οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα (7%)
- η οξεία εγκεφαλίτιδα (0,1%) η οποία εκδηλώνεται με υπερπυρεξία, ανησυχία, διέγερση, θόλωση της διάνοιας, σπασμούς και κώμα
- υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις (SSPE), μια σπάνια επιπλοκή που μπορεί να εμφανιστεί 7 χρόνια μετά από την εκδήλωση της ιλαράς και οφείλεται σε βλάβη των εγκεφαλικών κυντάρων

Οι ενήλικες εμφανίζουν τις εξής επιπλοκές:

- πνευμονία (30%), μέση πυώδης ωτίτιδα (29%), ιγμορίτιδα (25%)  
Σε μια **έγκυο** μπορεί να προκαλέσει:  
• αποβολή του εμβρύου, πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος νεογνού

Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες,

Η σχολαστική τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και ο εμβολιασμός των μαθητών, **πέραν του ότι είναι υποχρεωτικός και προϋπόθεση για τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο**, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προστασίας παιδιών και ενηλίκων από τα λοιμώδη νοσήματα.


Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε

**Να προχωρήσετε άμεσα στον εμβολιασμό των παιδιών σας με τα ενδεδειγμένα εμβόλια.** Επισημαίνουμε ότι:

- η χορήγηση του εμβολίου πρέπει να γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με τον γιατρό, παιδίατρο εφόσον πρόκειται για παιδιά ή άλλον γιατρό εφόσον πρόκειται για ενηλίκους.
- Οι υπηρεσίες της Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Υγιεινής είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και βοήθεια.

Ο Διευθυντής ΠΕ Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος



Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας  
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Σερρών

Αναστασιάδης Αναστάσιος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ - Μ.Σ.Κ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  
ΑΙΚΑ : 18126903311 - ΤΣΑΥ : 115965 |